

**Cabral®**  
24 Draje



**Formülü :**

1 draje;

Etken madde : 400 mg Feniramidol HCl

Yardımcı madde : Tartrazine, titandioksit, toz şeker.

**Farmakolojik Özellikleri :**

Cabral, beyin ve medulla spinaliste polysinaptik refleksleri bloke etmek suretiyle, ağrı-kasılma zincirini yıkar. Bu suretle adale gerginliklerini giderir, adale ağrılarında kuvvetli analjezik etki yapar. Monosinaptik refleksleri etkilemez.

Myorelaksan ve analjezik olarak Cabral, çizgili adale ve hareket sisteminin diğer yapılarında akut ve kronik ağruların tedavisinde endikedir.

**Endikasyonları :**

Bel ağrıları, lumbago, siyatik, disk rahatsızlıkları ve mediko-mekanik veya siropratik, mesela su altı masajları gibi diğer tedavileri destekleyici olarak kullanılır. Adalelerdeki gerginlikleri giderir, ağrıyı geçirir ve kramp halindeki iskelet adalesinin fonksiyonunu sağlar.

**Kontrendikasyonları :**

Preparatın bileşiminde yeralan herhangi bir maddeye karşı hassasiyeti olan kişilerde kullanılmamalıdır.

**Uyarılar / Önlemler :**

Antikoagülanlarla birlikte alındığında kanama, oral antidiabetiklerle karbonhidrat metabolizmasında değişiklik, antikonvülsiflerle göz titremesi, görme bozuklukları, koordine olmayan hareketler ortaya çıkarsa Cabral'in kesilmesi ve doktora gidilmesi tavsiye olunur. İlaçlarda boyar madde olarak kullanılan Tartrazine limitlerin altında olduğu halde hassasiyet reaksiyonu gösterme potansiyeli bulunduğundan dikkatle kullanılması tavsiye edilir.

**Yan Etkiler / Advers Etkiler :**

Bazı hassas hastalarda midede dolgunluk veya bulantı, dilde yanma duygusu veya deri eksentemi yapabilir. Fakat çabuk geçicidir, uyuşukluk, kaşıntı ve deri döküntüleri görülebilir. Eğer hipersensivite veya deri döküntüleri oluşursa ilaç verilmesi durdurulur.

**BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.**

**İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler :**

Cabral draje; kumarin deriveleri (antikoagülanlar), tolbutamid, oral antidiabetik ve difenilhidantoin ile tedavi gören hastalarda, bu ilaçların etkilerini artıracığından dikkatle kullanılmalıdır.

**Kullanım Şekli ve Dozu :**

Günde 3 kere 1-2 draje, yemeklerden sonra çiğnenmeden yutulur.

**Doz Aşımı ve Tedavisi :**

Günlük doz, 3200 mg'a kadar iyi tolere edilmektedir. Ancak ilaca bağlı herhangi bir semptom görülür ise doktora danışılmalıdır.

**Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj :**

24 drajelik blister.

**Saklama Koşulları :**

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Piyasada Mevcut Diğer Farmasotik Dozaj Şekilleri :**

3 ml x 3 Ampul.

İlaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Doktora danışmadan kullanmayınız.

**Ruhsat Sahibi :** Dr. F. Frik İlaç Sanayii ve Tic. A.Ş. İSTANBUL

**İmal Yeri :** Yeni İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş. Esenyurt/Istanbul

**Ruhsat Tarihi ve No :** 11.11.1970 - 106/12

**Reçete ile satılır.**